

**Aufgabe 1:** Geben Sie eine Basis des Tangentialraum an den Graphen einer glatten Funktion  $(x, y) \rightarrow f(x, y)$  an.

**Aufgabe 2:** Berechnen Sie die Integrale:

a)  $\int_0^{\pi} \sin x \cos x dx$

b)  $\int_0^1 \frac{(1-x)^2}{1+x^2} dx$

c)  $\int_0^1 x^2 e^x dx$

Zur Selbstkontrolle:  $0, 1 - \ln 2, e - 2$

**Aufgabe 3:** Was ist die Fläche des Einheitsdreiecks  $\hat{T}^2$  und das Volumen des Einheits tetraeders  $\hat{T}^3$ ?

Zur Selbstkontrolle:  $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}$

**Aufgabe 4:** Berechnen Sie mit Hilfe des Satzes von Taylor den Grenzwert

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2},$$

wobei  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dreimal stetig differenzierbar ist.

Zur Selbstkontrolle:  $f''(x)$

**Aufgabe 5:** Geben Sie auf dem offenen Intervall  $(0, 1)$  eine Quadraturformel mit 3 Knoten mit den Werten für die Gewichte explizit an.

Zur Selbstkontrolle: Z.B. Knoten  $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$  und Gewichte  $\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$

**Aufgabe 6:** Wie berechnet man auf einem Dreieck mit Knoten  $p_0, p_1, p_2$  die baryzentrischen Koordinaten  $\lambda_0, \dots, \lambda_2$  eines Punktes  $x$ ?

**Aufgabe 7:** Geben Sie die Formel für die Taylorentwicklung dritter Ordnung einer Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  im Punkt  $x = 1$  an. Wenden Sie diese Formel auf  $f(x) = \sin(\pi x)$ .

Zur Selbstkontrolle:  $f(y) = -\pi(y-1) + \frac{\pi^3}{6}(y-1)^3 + O((y-1)^4)$

**Aufgabe 8:** Berechnen Sie die quadratische Lagrangeinterpolation der Funktion  $\cos(x)$  für Knoten  $\phi/2, 0, -\phi/2$  für festes  $\phi \in (0, \frac{\pi}{2})$ .

Zur Selbstkontrolle:  $1 - (1 - \cos \frac{\phi}{2}) \frac{4x^2}{\phi^2}$

**Aufgabe 9:** Geben Sie die Formel der Lagrangeinterpolation für allgemeine Knotenmenge an.

**Aufgabe 10:** Für welches  $m$  gilt  $\frac{u(t)-u(t-\tau)}{\tau} - u'(t - \tau/2) = O(\tau^m)$  im Fall glatter Funktionen  $u$ ?

Zur Selbstkontrolle:  $m = 2$

**Aufgabe 11:** Was sagt der Fundamentalsatz der Algebra?

**Aufgabe 12:** a) Berechnen Sie alle Lösungen der Gleichung  $z^4 = 16$  in  $\mathbb{C}$ .

b) Berechnen Sie  $(5 + 6i)(7 - 3i)$ .

c) Berechnen Sie  $\frac{2-2i}{|2-2i|}$ .

d) Berechnen Sie  $(\cos \phi + i \sin \phi)(\cos \psi + i \sin \psi)$ .

Zur Selbstkontrolle:  $2, 2i, -2, -2i; 53 + 28i; \frac{1-i}{\sqrt{2}}; \cos(\phi + \psi) + i \sin(\phi + \psi)$

**Aufgabe 13:** Schreiben Sie  $\sin^4 x$  und  $\sin^2 x \cos^2 x$  als Linearkombination von  $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots$

**Tipp:** Verwenden Sie die Formeln

$$\sin(x) = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}), \quad \cos(x) = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})$$

Zur Selbstkontrolle:  $\frac{1}{8} \cos(4x) - \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{3}{8}; \frac{1}{8}(1 - \cos(4x))$

**Aufgabe 14:** Geben Sie die zur Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

gehörende Diagonalmatrix  $D$ , d.h.  $A = UDU^T$  mit  $U^T = U^{-1}$  an. Berechnen Sie die Spur und die Determinante von  $A$  und  $D$  sowie die Eigenvektoren der Matrix  $A$ .

Zur Selbstkontrolle: Eigenwerte 1, 2, 4

**Aufgabe 15:** Welche Kurve verbirgt sich hinter der Menge

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}y^2 + xy = 1 \right\}?$$

Zur Selbstkontrolle: Halbachsen 1 und  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

**Aufgabe 16:** Sei

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 6 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie

- a)  $\max_{x \in \mathbb{R}^3} \frac{Ax \cdot x}{x \cdot x}$ ,
- b)  $\min_{x \in \mathbb{R}^3} \frac{Ax \cdot x}{x \cdot x}$ .

Zur Selbstkontrolle: 12 und -1

**Aufgabe 17:** Sei  $A$  eine  $n \times n$  Matrix mit bekannter Singulärwertzerlegung  
 $A = UDV^T$ .

- a) Geben Sie eine notwendige und hinreichende Bedingung für die Singulärwerte an, damit  $A$  invertierbar ist.
- b) Bestimmen Sie für diesen Fall die Singulärwertzerlegung von  $A^{-1}$ .
- c) Für welche  $\lambda$  ist  $A + \lambda I$  für symmetrisches  $A$  invertierbar?
- d) Finden Sie dann die Singulärwertzerlegung von  $(A + \lambda I)^{-1}$  im Fall, dass  $A$  symmetrisch ist.

**Aufgabe 18:** Sei  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  eine quadratische Matrix.

- a) Wenn  $A$  orthogonal ist, sind alle Singulärwerte von  $A$  gleich 1.  
ja  nein
- b) Wenn  $A$  orthogonal ist, sind die Singulärwerte von  $A$  gleich den Eigenwerten von  $A$ .  
ja  nein
- c) Wenn  $A$  orthogonal ist, sind die Singulärwerte von  $A$  gleich den Eigenwerten von  $A^T A$ .  
ja  nein
- d) Wenn  $A$  symmetrisch ist, sind alle Singulärwerte von  $A$  gleich 1.  
ja  nein
- e) Wenn  $A$  symmetrisch ist, sind alle Singulärwerte von  $A$  gleich den Eigenwerten von  $A$ .  
ja  nein
- f) Wenn  $A$  symmetrisch ist, sind alle Singulärwerte von  $A$  gleich den Beträgen derjenigen Eigenwerte von  $A$ , die ungleich Null sind.  
ja  nein

Zur Selbstkontrolle: J, N, J, N, N, J

**Aufgabe 19:** Zeigen Sie, dass

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

positiv definit ist.

**Aufgabe 20:** Wie testet man, ob eine Zahl  $\lambda$  Eigenwert einer quadratischen Matrix  $A$  ist?

**Aufgabe 21:** Wann ist eine Matrix diagonalisierbar?

**Aufgabe 22:** Berechnen Sie die Lösung des Anfangswertproblems

$$\begin{aligned} x_1'(t) &= 2x_1(t) - x_2(t), & x_1(0) &= -1, \\ x_2'(t) &= -x_1(t) + 2x_2(t), & x_2(0) &= 2 \end{aligned}$$

mit Hilfe der Exponentialfunktion  $\exp At$  für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Zur Selbstkontrolle:  $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^t - 3e^{3t} \\ e^t + 3e^{3t} \end{pmatrix}$

**Aufgabe 23:** Geben Sie die Lösung der Differentialgleichung  $\dot{x} = 5x + 3$  mit  $x(0) = 2$  an.

Zur Selbstkontrolle:  $\frac{13}{5}e^{5t} - \frac{3}{5}$

**Aufgabe 24:** Man löse die Differentialgleichung

a)  $\dot{x} = \frac{1}{\sin(x)}, x(0) = x_0$

b)  $\dot{x} = x^2, x(0) = x_0$

Zur Selbstkontrolle:  $\arccos(\cos(x_0) - t), \frac{1}{x_0 - t}$

**Aufgabe 25:** Geben Sie für die Differentialgleichung  $\dot{x} = \sin(x)$  mit  $x(0) = x_0$  ein numerisches Verfahren zweiter Ordnung an.

**Aufgabe 26:** Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die von der Kurve

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} 2 \cos t + \cos 2t \\ 2 \sin t - \sin 2t \end{pmatrix},$$

$0 \leq t \leq 2\pi$  eingeschlossen wird.

**Tipp:**

$$\cos t \cos 2t = \frac{1}{4}(e^{3it} + e^{-3it} + e^{it} + e^{-it}) = \frac{1}{2}(\cos 3t + \cos t)$$

Zur Selbstkontrolle:  $2\pi$

**Aufgabe 27:** Berechnen Sie die partiellen Ableitungen erster Ordnung der Funktion

$$f(x, y) = \int_x^{x-y} \exp(-t^2(x+y)) dt$$

**Aufgabe 28:** Wie differenziert man eine Funktion  $f(t) = \int_0^t g(t, s) ds$ ?

**Aufgabe 29:** Wie lautet der Satz von Gauß? Wenden Sie dieses Satz auf die Vektorfelder  $f(x, y) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  und  $g(x, y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  an.

**Aufgabe 30:** Berechnen Sie das Volumen des Torus, der durch Rotation des Dreieckes

$$\Delta = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2 \leq x \leq 3, y = 0, 2 - x \leq z \leq x - 2 \}$$

um die z-Achse entsteht,

- a) indem Sie die Formel zur Berechnung des Volumens eines Rotationskörpers (aus der Vorlesung) benutzen.
- b) indem Sie die Schnittflächen berechnen, die sich durch Schneiden des Torus mit Ebenen (im  $\mathbb{R}^3$ ) ergeben, die senkrecht zur z-Achse sind, und über diese Schnittflächen (auf-) integrieren.
- c) Berechnen Sie die Oberfläche dieses Torus.

Zur Selbstkontrolle:  $\frac{16}{3}\pi, 12(\sqrt{2} + 1)\pi$

**Aufgabe 31:** Man berechne das Volumen des Körpers, der von den Flächen  $x + y + z = 2$ ,  $x^2 + y^2 = 1$  und  $z = 0$  begrenzt wird.

Zur Selbstkontrolle:  $2\pi$

**Aufgabe 32:** Sei  $\Omega$  ein beschränktes Gebiet im  $\mathbb{R}^3$  mit glattem Rand, welches den Nullpunkt nicht enthält. Zeigen Sie

$$\int_{\partial\Omega} \frac{x \cdot N}{\|x\|} da = 2 \int_{\Omega} \frac{1}{\|x\|} dx .$$

Dabei bezeichnet  $N$  die äußere Normale von  $\partial\Omega$ .

**Aufgabe 33:** Existieren folgende Integrale (im Sinne des Kapitels über die Integration unbeschränkter Funktionen)?

a)

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$$

ja

nein

b)

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

ja

nein

c)

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx dy}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$$

ja

nein

d)

$$\int \int_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dx dy}{\sqrt{1+x^2+y^2}}$$

ja

nein

e)

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{dx dy dz}{1+x^2+y^2+z^2}$$

ja

nein

Zur Selbstkontrolle: J, J, N, J, N

**Aufgabe 34:** Wie lautet der Transformationssatz der Integralrechnung in mehreren Dimensionen?

**Aufgabe 35:** Gegeben sei ein Kegel der Höhe 5 mit einer Grundfläche von Radius 1 und konstanter Dichte 1. Berechnen Sie den Schwerpunkt dieses Kegels.

Zur Selbstkontrolle:  $(0, 0, \frac{5}{4})$

**Aufgabe 36:** Welche Kurve  $\Gamma$  beschreibt die Funktion  $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$  mit

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} \cos(2\pi t) \\ \sin(2\pi t) \\ t \end{pmatrix}$$

wobei  $t \in [0, 2]$  gilt?

Berechnen Sie die Länge der Kurve  $\Gamma$ .

Zur Selbstkontrolle:  $2\sqrt{4\pi^2 + 1}$

**Aufgabe 37:** Gegeben sei die Parametrisierung

$$x(\phi, h) = \begin{pmatrix} \cos(2\pi\phi) \\ \sin(2\pi\phi) \\ h \end{pmatrix}$$

mit  $\phi \in [0, 1)$  und  $h \in [0, 1]$ .

- Welche Hyperfläche beschreibt diese Parametrisierung?
- Betrachten Sie die Kurven

$$\begin{aligned} \gamma_1(t) &= \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}, & t \in [0, 1] \\ \gamma_2(t) &= \begin{pmatrix} t \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, & t \in [0, 1] \end{aligned}$$

im Parameterbereich. Beschreiben Sie die Kurven  $x \circ \gamma_i$  mit  $i = 1, 2$ , die auf der parametrisierten Fläche liegen.

- Berechnen Sie mit Hilfe dieser beiden Kurven zwei Tangentialvektoren an die Fläche im Punkt  $x(0, \frac{1}{2})$ .
- Berechnen Sie in diesem Punkt einen Normalenvektor an die Fläche.
- Berechnen Sie den metrischen Tensor auf dieser Fläche.
- Verwenden Sie den metrischen Tensor, um die Länge der beiden Kurven  $x \circ \gamma_i$  mit  $i = 1, 2$  auf der Fläche zu berechnen.
- In welchem Winkel schneiden sich die beiden Kurven?

Zur Selbstkontrolle: Metrik  $\begin{pmatrix} 4\pi^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

**Aufgabe 38:** Wie sieht die Spiegelungsmatrix aus, die im QR-Verfahren zur Elimination der ersten Spalte der Matrix  $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$  verwendet wird?

**Aufgabe 39:** Berechnen Sie die QR-Zerlegung der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 12 \end{pmatrix}.$$

Zur Selbstkontrolle:  $R = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 8 \\ 0 & -5 & -8 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

**Aufgabe 40:** Wann ist eine Abbildung  $f$  orthogonal und wann ist eine quadratische Matrix  $A$  orthogonal?

**Aufgabe 41:** Gibt es neben Drehungen und Spiegelungen noch andere orthogonale Abbildungen im  $\mathbb{R}^2$ ?

**Aufgabe 42:** a) Es sei  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine periodische Funktion mit Periode  $2\pi$  und Lipschitz-stetig. Geben Sie die Fourierdarstellung (einschließlich der Formeln zur Berechnung der Koeffizienten) von  $g$  an.

b) Angenommen die Funktion  $g$  wäre nun  $\pi$  periodisch. Gilt die Fourierdarstellung weiterhin?

c) Betrachten Sie nun die spezielle Funktion

$$f(x) = \sin^2(x).$$

Begründen Sie, warum für die Fourierkoeffizienten  $b_k$  aus der Vorlesung für alle  $k \geq 1$  gilt  $b_k = 0$ .

d) Berechnen Sie die Fourierkoeffizienten  $a_0, a_1$  und  $a_2$  aus der Vorlesung für  $f(x)$  (Tipp: Verwenden Sie zur Berechnung von  $a_2$ :  $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$ ). Warum gilt dies?).

Zur Selbstkontrolle:  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x)$

**Aufgabe 43:** Geben Sie eine hinreichende Bedingung dafür an, dass eine Funktion  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  in  $x = (2, 2)$  ein lokales Maximum hat.

**Aufgabe 44:** Geben Sie die Taylorentwicklung zweiter Ordnung einer glatten Funktion  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  an?

**Aufgabe 45:** Was sagt der Satz von Schwarz aus über eine zweimal stetig differenzierbare Funktion  $w : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ?

**Aufgabe 46:** Welche Aussagen sind richtig für eine zweimal stetig differenzierbare Funktion  $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $D = \{x \mid \|x\| < 1\}$  ?

a) Hat  $f$  ein globales Minimum an der Stelle  $a$ , dann gilt  $\nabla f(a) = 0$ .  
ja  nein

b) Hat  $f$  ein globales Minimum an der Stelle  $a$ , dann ist die Hesse-Matrix  $H(a)$  positiv definit.  
ja  nein

c) Gilt  $\nabla f(a) = 0$  und ist  $H(x)$  positiv definit für alle  $x \in D$ , dann hat  $f$  ein globales Minimum bei  $a$ .  
ja  nein

d) Gilt  $\nabla f(a) = 0$  und hat  $H(a)$  nur positive Eigenwerte, dann hat  $f$  bei  $a$  ein lokales Minimum.  
ja  nein

e) Ist  $H(x)$  positiv definit für alle  $x \in D$ , dann ist jedes lokale Minimum auch globales Minimum.  
ja  nein



Zur Selbstkontrolle: J, N, J, J, J

**Aufgabe 47:** Was ist der Gradient der Abbildung  $f(x) = Ax \cdot x + b \cdot x$  für  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  symmetrisch und  $b, x \in \mathbb{R}^n$ ?

**Aufgabe 48:** Was folgt aus dem Satz über implizite Funktionen bezüglich der Null-Niveaumenge der Funktion  $f(x, y) = x^4 + y^4 - 1$ ?

**Aufgabe 49:** Berechnen Sie den kritischen Punkt der Funktion

$$f(x, y) = 3x^2 - 5xy - 2y^2 + 3$$

und entscheiden Sie, ob ein Maximum, Minimum oder Sattelpunkt vorliegt.

Zur Selbstkontrolle: Sattelpunkt im Ursprung

**Aufgabe 50:** Betrachten Sie die Gleichungen:

$$\begin{aligned}h(x, y, z) &:= (x - 2)^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0, \\g(x, y, z) &:= x - 1 = 0, \\f(x, y, z) &:= \begin{pmatrix} h(x, y, z) \\ g(x, y, z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

- a) Geben Sie eine geometrische Interpretation der Situation an. Welche Figuren schneiden sich hier? Was ist die Schnittmenge dieser Figuren?
- b) Beschreiben Sie die Schnittmenge vollständig (in insgesamt 4 Stücken) als Funktionen über  $z$  bzw. über  $y$ .

**Tipp:** Fertigen Sie eine Skizze der Situation an!

**Aufgabe 51:** Bestimmen Sie denjenigen Punkt  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$  auf dem Rotationshyperboloid  $H := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 - 1 = 0\}$ , der vom Punkt  $(1, -1, 0)$  den kleinsten Abstand hat.

Zur Selbstkontrolle:  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$

**Aufgabe 52:** Wann ist eine glatte Kurve  $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}$  eine geodätische Kurve auf einer glatten Hyperfläche  $\mathcal{M}$ ?

**Aufgabe 53:** Geben Sie die Definition der Absolutkrümmung einer bogenlängenparametrisierten Kurve an?

**Aufgabe 54:** Betrachten Sie die durch  $X : (0, 2\pi) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$(s, v) \mapsto X(s, v) = \begin{pmatrix} \cos s \\ \sin s \\ 0 \end{pmatrix} + v \begin{pmatrix} -\sin s \\ \cos s \\ 1 \end{pmatrix}$$

parametrisierte Fläche.

- a) Zeigen Sie, dass es sich um das einschalige Drehhyperboloid mit der Gleichung  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$  handelt und fertigen Sie eine Skizze zur Veranschaulichung der Fläche an.
- b) Zeichnen Sie die beiden Kurven (z.B. für  $v_0 = 0, \pm 1, \pm 2$  und  $s_0 = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ )

$$\gamma_1(s) := X(s, v_0) = \begin{pmatrix} \cos s - v_0 \sin s \\ \sin s + v_0 \cos s \\ v_0 \end{pmatrix}, \quad v_0 = \text{const} \in \mathbb{R},$$

$$\gamma_2(v) := X(s_0, v) = \begin{pmatrix} \cos s_0 - v \sin s_0 \\ \sin s_0 + v \cos s_0 \\ v \end{pmatrix} \quad s_0 = \text{const} \in (0, 2\pi).$$

in Ihre Skizze.

- c) Berechnen Sie die Absolutkrümmung der beiden Kurven.

Zur Selbstkontrolle: Krümmungen  $\frac{1}{\sqrt{1+v_0^2}}, 0$